



## ANTIHYPERTENZIVA A HYPOLIPIDEMIKA

VYŠETŘENÍ HLADIN V KRVÍ

Rutinní analýzy provádíme 1x týdně

LÉČIVO	Dostup- nost	Farmakoskopina	Pozn.	Minimum sérum [ml]
<b>AMILORID</b>	Po-Pá 8-15	diuretikum		0,3
<b>AMLODIPIN</b>	Po-Pá 8-15	Ca blokátor		1,5
<b>ATORVASTATIN</b>	Po-Pá 8-15	hypolipidemikum		1,5
<b>BETAXOLOL</b>	Po-Pá 8-15	betablokátor		0,8
<b>BISOPROLOL</b>	Po-Pá 8-15	betablokátor		0,8
<b>CANDESARTAN</b>	Po-Pá 8-15	antag.angiotensinu		0,5
<b>DOXAZOSIN</b>	<b>STATIM</b>	alfa1blokátor		0,3
<b>EZETIMIB</b>	Po-Pá 8-15	hypolipidemikum		1,5
<b>felodipin</b>	Po-Pá 8-15	Ca blokátor	V plánu	
<b>FUROSEMID</b>	Po-Pá 8-15	diuretikum	Jen průkaz	0,3
<b>HCHLOROTHIAZID</b>	Po-Pá 8-15	diuretikum		0,8
<b>CHLORTALIDON</b>	Po-Pá 8-15	diuretikum		0,3
<b>INDAPAMID</b>	Po-Pá 8-15	diuretikum		0,8
<b>LOSARTAN</b>	Po-Pá 8-15	antag.angiotensinu		0,8
<b>METOPROLOL</b>	Po-Pá 8-15	betablokátor		1,5
<b>NEBIVOLOL</b>	Po-Pá 8-15	betablokátor		1,5
<b>NITRENDIPIIN</b>	Po-Pá 8-15	Ca blokátor		1,5
<b>PERINDOPRILÁT</b>	Po-Pá 8-15	ACE inhibitor		1,5
<b>RAMIPRILÁT</b>	Po-Pá 8-15	ACE inhibitor		1,5
<b>RILMENIDIN</b>	Po-Pá 8-15	imidazol agonista		1,5
<b>ROSUVASTATIN</b>	Po-Pá 8-15	hypolipidemikum		1,5
<b>SPIRONOLACTON + M</b>	Po-Pá 8-15	diuretikum		0,3
<b>TELMISARTAN</b>	Po-Pá 8-15	antag.angiotensinu		1,5
<b>TRANDOLAPRILÁT</b>	Po-Pá 8-15	ACE inhibitor		1,5
<b>URAPIDIL</b>	Po-Pá 8-15	alfa1blok+ agonista 5-HT1		0,8
<b>VALSARTAN</b>	Po-Pá 8-15	antag.angiotensinu		0,3
<b>VERAPAMIL</b>	<b>STATIM</b>	Ca blokátor		0,3